

خونریزی های نیمه اول بارداری

| شناسنامه بروشور آموزشی | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| کدپمفلت | عنوان | تهیه کننده | تایید کننده |
| PH-TR-01 | خونریزی های نیمه اول بارداری | واحد آموزش به بیمار | سوپروایزر آموزشی |



خونریزی واژینال در دوران بارداری می تواند اغلب در سه ماهه اول بارداری رخ دهد و ممکن است نشانه ای از مشکلات جدی باشد.

مهم ترین و بارزترین علامت سقطها خونریزی می باشد.

۱- تهدید به سقط:

به ترشح خونی یا خونریزی واژن در نیمه اول بارداری گفته می شود.

۲- سقط اجتناب ناپذیر:

در صورتی که پارگی پرده‌های جنی نیا اتساع دهانه رحم، در نیمه‌ی اول بارداری اتفاق بیافتد، سقط اجتناب ناپذیر است.

۳- سقط ناقص:

در سقط‌های قبل از هفته‌ی دهم بارداری جفت و جنین با هم دفع می‌شوند. پس سقط کامل است. اما بعد از هفته دهم جداگانه دفع می‌شوند که سقط ناقص گفته می‌شود.

۴- سقط عفونی: به احتباس فراورده‌های مرده‌ی لقاح به مدت چندین هفته گفته می‌شود. اغلب موارد سقط فراموش شده خود به خود دفع می‌شود.

۵- سقط مکرر:

وقوع سه یا بیشتر سقط پشت سر هم سقط مکرر می گویند. علل مهم آن اختلالات کروموزومی، اندوکراین یا تغییر در سیستم ایمنی می باشد.

۶- سقط القایی:

به خاتمه‌ی بارداری به روش طبی یا جراحی پیش از رسیدن جنین به مرحله‌ی قابل حیات گفته می شود.

۷- حاملگی خارج رحمی:

حاملگی نابجای بارداری که در جایی خارج از رحم لوله فالوپ و سرویکس تشکیل می شود. شایع ترین محل آن در لوله‌های رحمی است شایع ترین علائم به ترتیب: درد شکم، آمنوره بایا بدون لکه بینی و خونریزی واژینال، نشانه‌های گوارشی، سرگیجه می باشد.

واحد آموزش بیمارستان شهید دکتر چمران

با آرزوی سلامتی



@Sepehr.card No-167