



علایم افزایش قند خون

- خستگی
- خشکی دهان و تشنگی
- اختلال در دید
- پرادراری
- خواب آلودگی

اقداماتی که باید هنگام افزایش قند خون انجام شود:

- (۱) کنترل قند خون با فواصل کمتر
- (۲) نوشیدن مایعات بدون قند
- (۳) انجام ورزش (در صورتی که قند خون شما زیر ۳۰۰ باشد و در ادرار کتون وجود نداشته باشد).
- (۴) در صورت انجام اقدامات فوق و عدم کاهش قند خون مشاوره با پزشک الزامی می باشد.

دیابت یک بیماری پرهزینه است؛ با تشخیص زودهنگام و کنترل آن متholm هزینه گراف نشود.

بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت و انجمن توسعه سلامت مهر پارسی

دفتر مرکزی: ۰۲۱-۸۸۴۱۰۶۷۹ - ۰۵۱۱-۷۶۵۰۴۰۰ - دفتر تهران: ۰۲۱-۸۰۰۰۸۵۶۰ - سامانه پیام کوتاه: ۰۵۹۰-۰۰۰۰۸۵۶۰

وبسایت: info@idpcf.com پست الکترونیک: www.idpcf.com

اگر قند خون تان افزایش نیافرته بود دوباره این کار را تکرار کنید تا قند خون به ۷۰ میلی گرم بر دسی لیتر برسد. سپس اگر بیش از یک ساعت تا صرف وعده‌ی غذایی بعدی باقی مانده باید یک میان‌وعده مصرف شود.

اگر فرد بیهوش شده و نمی‌تواند از راه دهان چیزی بخورد باید به اورژانس اطلاع داد. سپس تا رسیدن آمبولانس باید آمپول گلوکاگون (هورمون افزایش‌دهنده قند خون) توسط فردی که آموزش دیده تزریق گردد.

☞ به فردی که بی‌هوش شده نباید از راه دهان چیزی خورانده شود.

☞ فرد بی‌هوش باید به پهلو خوابانده شود.

● مصرف میان‌وعده‌ها تا حد زیادی می‌تواند از حملات افت قند جلوگیری کند.

افزایش قند خون (هاپر گلایسمی)

حالی را که قند خون بیش از اندازه بالا باشد، افزایش قند خون (هاپر گلایسمی) می‌نامند.

علل افزایش قند خون

- پرخوری
- عفونت
- استرس
- کاهش فعالیت فیزیکی
- عدم مصرف قرص یا انسولین
- جراحت یا بیماری‌های دیگر

علایم افت قند خون در شب و هنگام خواب

- احساس خستگی و سردرد پس از بیدار شدن
- کابوس دیدن
- نمناک بودن لباس و ملافه

هنگام افت قند خون ممکن است هیچ کدام از علایم را نداشته باشد. بهترین راه برای اطلاع از افت قند خون، تست قند خون است.

- اگر به دفعات مکرر دچار افت قند خون می‌شوید باید زیر نظر پزشک خود، تغذیه، ورزش و میزان داروی تان را تنظیم کنید.
- از خوردن غذاهای چرب و پرکالری مانند کیک، بستنی و دسرها خودداری کنید.

اقداماتی که باید هنگام افت قند خون انجام دهید

- پس از تست قند خون و اطمینان از افت قند خون، باید بلاfacسله قندی که سریع جذب می‌گردد، استفاده کنید.
- باید همیشه قند همراه خود داشته باشد.
 - چربی شکلات مانع از جذب سریع آن می‌شود.

موادی که به سرعت قند خون را بالا می‌برد

- ۳ حبه قند
 - نصف لیوان آب میوه
 - یک قاشق شکر یا عسل
- ۱۵ دقیقه پس از مصرف یکی از مواد فوق، قند خون تان را اندازه بگیرید.

علایم اولیه هایپوگلایسمی



- افزایش ضربان قلب



- گرسنگی شدید



- تعریق



- عصبانیت



- احساس ضعف و خستگی

افت قند خون در هر زمانی از روز یا شب ممکن است اتفاق افتد.

افت قند خون (هایپوگلایسمی)

افت قند خون (هایپوگلایسمی) یکی از مشکلات شایع در افراد دیابتی است. این مشکل مخصوصاً در بیماران دیابتی که تزریق انسولین دارند شایع تراست و زمانی اتفاق می‌افتد که قند خون بین ۵۰-۷۰ میلی‌گرم بر دسی لیتر باشد. به این حالت افت خفیف قند خون گفته می‌شود؛ زمانی که قند خون به زیر ۵۰ میلی‌گرم بر دسی لیتر برسد به این حالت افت شدید قند خون گفته می‌شود.

علل به وجود آور نده افت قند خون

- تزریق زیاد انسولین
- حذف وعده غذایی یا میان وعده
- ورزش زیاد یا فعالیت زیاد
- دریافت کمتر کربوهیدرات‌ها
- به تأخیر افتدان وعده غذایی
- ابتلا به برخی بیماری‌ها همانند اسهال

زمان‌های معمول افت قند خون

- قبل از وعده‌های غذایی
- بعد یا در حین فعالیت ورزشی
- زمانی که اثر انسولین به اوج می‌رسد

