

سونوگرافی کالر داپلر

شناسنامه بروشور آموزشی			
کدیمفلت	عنوان	تهیه کننده	تایید کننده
PH-TR-01	سونوگرافی کالر داپلر	واحد آموزش به بیمار	سوپروایزر آموزشی

جهت بررسی میزان خورسانی به ارگان های مختلف در بدن از این روش سونوگرافی استفاده می شود. امواج ناشی از جریان خون هم به صورت تصاویر موجی و هم به صورت تصاویر بازسازی شده سیاه و سفید و رنگی سونوگرافی مشاهده می شود و در صورت وجود کاهش و یا افزایش جریان خورسانی در اعضاء این موضوع قابل بررسی است و ارزش قابل توجهی در تشخیص برخی از ناهنجاری های مادرزادی و بیماری های اکتسابی دارد.

این آزمون به منظور بررسی عروق (شریانها و وریدها) از لحاظ وجود انسداد یا تنگی و تعیین محل آن و بررسی جریان خون در عروق انجام می گیرد و به دو صورت شریانی و وریدی می باشد.

این نوع سونوگرافی شامل سونوگرافی داپلر از عروق شکمی، داپلر از عروق اندام تحتانی، داپلر از عروق اندام فوقانی، داپلر از عروق کاروتید (عروق گردنی) و داپلر از عروق کلیوی می باشد.

این سونوگرافی با تعیین وقت قبلی انجام میگیرد.

آمادگی لازم:

غیر از سونوگرافی از عروق شکمی و کلیه ها سایر موارد نیازی به آمادگی خاصی ندارد.

آمادگی لازم برای سونوگرافی داپلر از عروق شکمی و کلیه

برای دید بهتر در این سونوگرافی باید روده های بیمار کاملا تخلیه شود.

(۱) ۱۰ الی ۱۲ ساعت قبل از انجام سونوگرافی ناشتا باشد.

(۲) ۴۰ گرم روغن کرچک یا ۶ عدد قرص بیزاکودیل را قبل از صرف غذای ساده، هر دو ساعت مصرف کند.

(۳) ۲-۶ عدد قرص دایمتیکون جهت جذب گاز روده ها بعد از صرف روغن کرچک ، هر ۲ ساعت ۲ عدد ، بدون آب جویده شود.

(ج) بیمار بایستی صبح ناشتا جهت سونوگرافی مراجعه نماید.

واحد آموزش بیمارستان شهید دکتر چمران

با آرزوی سلامتی



@Sepehr.card No-167